

DRÄKTIGHETSUNDERSÖKNING - DIKOR

Hösten kommer mer och mer och även om dikorna kan gå ute på bete ett tag till, så kan det vara bra att börja fundera på vad som behöver göras när korna stallats in. Om inte korna har dräktighetsundersökts tidigare under sommaren är det ett bra tillfälle att göra det när de stallats in.

Syftet med att dräktighetsundersöka korna säger ju sig själv – att ta reda på om kon är dräktig eller inte. Det fina med att veta om kon är dräktig eller inte, är ju att du vet vilka djur som inte är dräktiga och snabbt kan gallra bort dessa, och därmed kan du spara in på arbete och foder som annars hade gått åt till dessa djur. Du får ju också ett besked om i vilket dräktighetsstadie korna befinner sig i, och kan ha med det som underlag när du grupperar korna för vintersäsongen.

Det finns olika metoder för att dräktighetsundersöka korna, och du får kontakta din veterinär för att få reda på vilka alternativ som de erbjuder. Rektal palpation är de vanligaste metoden och denna innebär att man känner på äggstockar och livmoder genom ändtarmsväggen. En annan metod är ultraljud, och då kan dräktigheten konstateras redan så tidigt som vid 30 dagar.

Vill du veta mera, klicka på följande länkar:

<http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/not/kunskapsbank/management/dikalvsproduktion/draktighetsundersokning-av-dikor/>

HKSCAN
AGRI